



ድሮስፓይሮኖን/ኢትናይል ኤስትሮዳዮል (Drospirenone/ethinyl estradiol)

የመድሃኒት ስም ጀነሪክ:- ድሮስፓይሮኖን/ኢትናይል ኤስትሮዳዮል

ብራንድ ስሞች:- ያዝምን (Yasmin) ዛራሀ (Zarah) ሳይዳ (Syeda) ኦሴላ (Ocella)

ምድብ:- ፕሮጀስቲቭ/ኤስትሮጅን ሆርሞን የወሊድ መቆጣጠሪያዎች

ለምን ይወሰዳል?

ይህ መድሃኒት እርግዝናን ለመከላከል ይረዳል።

እንዴት ነው የሚሰራው?


በአፍ የሚወሰዱ የወሊድ መቆጣጠሪያ ክንፎች እንቁላል ወደ ማህፀን እንዳይወጣ በማድረግ እርግዝናን ይከላከላሉ። በተጨማሪ ጽንሰ እንዳይፈጠር የማህፀን ግድግዳ እና የማህፀን ፈሳሽ ላይ ተጽእኖ ያደርጋሉ። ይህ ከኒን ሁለት መድሃኒቶችን በውስጡ ይይዛል።

የመጀመሪያው ድሮስፓይሮኖን (Drospirenone) ሲሆን ሁለተኛው ኢትናይል ኤስትሮዳዮል (Ethinyl estradiol) ነው።

ኢትናይል ኤስትሮዳዮል (Ethinyl estradiol) በተፈጥሮ የሚገኘውን ኤስትሮጅን (estrogen) ሆርሞን የሚመስል ንጥረ ነገር ሲሆን ድሮስፓይሮኖን (Drospirenone) ፕሮጀስቲቭ (progestin) የሚባለውን ሌላ ሆርሞን እንዲመስል ተደርጎ የተሰራ ንጥረ ነገር ነው።

እነዚህ ሆርሞኖች በጉርምስና ወቅት በሴቶች እና በወንዶች ላይ የሚታየውን ለውጥ ጨምሮ በሴቶች የወር አበባ ኡደት፣ በእርግዝና፣ በአጥንት ጤንነት፣ በሜታቦሊዝም ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው።

በምን በምን መልኩ ተመርቶ ይታሸጋል?

 በአፍ የሚዋጥ ክኒን

ለዚህ ጽሁፍ እንደምሳሌ የምንወስደው የያዝምንን ክኒኖች ቀለም ነው። ለአንድ ወር የሚሆን የያዝምን ብሊስተር ካርድ ሆኖ አንድ ቢጫ ክኒኖች እና ሰባት ነጭ ክኒኖች ይኖሩታል። ነገር ግን እንደአገሩ እና እንደአምራቹ የተለያዩ ቀለም ያላቸው ክኒኖች ይኖራሉ። ለምሳሌ የዛራሀ ክኒኖች ሆኖ አንድ ሰማያዊ እና ሰባት ቢጫ ክኒኖች አሉት።



የያዝምን ክኒኖች እና ብሊስተር ካርድ


የዛራሀ ብሊስተር ካርድ

ከመጠቀም በፊት ማወቅ ያለብዎት ምንድነው?

ይህ መድሃኒት እርግዝና ለመከላከል የሚረዳው በየአለቱ በተመሳሳይ ሰዓት ሲወሰድ ብቻ ነው። እንዳይረሱ ጥረት ያድርጉ። ከረሱ “መድሃኒቴን መዋጥ ከረሳሁ ምን ማድረግ አለብኝ?” የሚለውን ክፍል ያንብቡ ወይም የጤና ባለሙያ ያማክሩ።

ይህን መድሃኒት መውሰድ እንደጀመሩ ለመጀመሪያው ሳምንት እርግዝናን ላይከላከል ይችላል። በዚህ የመጀመሪያ ሳምንት ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገድ (ለምሳሌ ኮንዶም) ይጠቀሙ።

መድሃኒትን መውሰድ ከመጀመር በፊት የመድሃኒቱ ካርድ ሆኖ ስምንት ክኒን እንዳለው ያረጋግጡ። ብዙ ጊዜ ብሊስተር ካርዱ ላይ ከየት መጀመር እንዳለብዎት የሚያመለክት ቀስት ይኖራል። በተጨማሪም ለማስታወስ እንዲረዳ የመድሃኒቱ ካርድ ላይ የክኒኖቹ አቀማመጥ በቀን እና በሳምንት ተስተካክሎ ይገኛል (ከታች የሚገኘውን ምስል ይመልከቱ።)



ዘወትር የሚያገኙት ቦታ ሌላ ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ (ለምሳሌ ኮንዶም) ያስቀምጡ። ክሊን መውሰድ የሚዘነጉበት አጋጣሚ ከተፈጠረ ይጠቅማል።

እርግዝና ከተከሰተ መድሀኒቱን መውሰድ ያቁሙ። መድሀኒቱ በጽንሰ ላይ ጉዳት አያደርስም (አያስወርድም)። ነገር ግን ከእርግዝና በሁዋላ ይህን መድሀኒት መውሰድ አስፈላጊ አይደለም።

የሚያጠቡ እናቶች ይህን መድሀኒት ሲወስዱ የጡት ወተት ይቀንሳል። በተጨማሪ መድሀኒቱ በጡት ወተት ውስጥ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አማራጭ ለማግኘት የጤና ባለሙያዎትን ይጠይቁ።

ይህ መድሀኒት በትክክል እንዳይሰራ የሚያደርጉ መድሀኒቶች

አንዳንድ መድሀኒቶች የዚህን መድሀኒት የእርግዝና መከላከል ችሎታ ሊቀንሱ ይችላሉ። ለኢንፎክሽን የሚታዘዙ ብዙ አንቲባዮቲክ (antibiotic) መድሀኒቶች ይህ ባህሪ ስላላቸው መድሀኒትዎን ከፋርማሲ ሲገዙ በአፍ የሚዋጡ ወሊድ መቆጣጠሪያ መድሀኒት ላይ ተጽእኖ እንደሌለው ፋርማሲስትዎን ይጠይቁ። ሌሎች ይህን መድሀኒት ሀይል ሊቀንሱ የሚችሉ መድሀኒቶች የሚከተሉት ናቸው፡-

- ባርቢቶሬት (Barbiturates)
- ቦሰንታን (Bosentan)
- ካርባማዘፒን (Carbamazepine)
- ፈልባሜት (Felbamate)
- ግሪዚዮፎልቪን (Griseofulvin)
- አክሰካርባማዘፒን (Oxcarbazepine)
- ፌንቶይን (Phenytoin)
- ራይፋምፕን (Rifampin)
- ሴንት ጆንስ ዎርት (St. John's wort)
- ቶፓይራሜት (Topiramate)

እንዲህ ያሉ መድሀኒቶችን በሚወስዱበት ጊዜ ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገዶችን (ለምሳሌ ኮንዶም) ይጠቀሙ።

ይህ መድሀኒት የማይታዘዝላቸው ሴቶች

ከሚከተሉት ህመሞች ወይም ሁኔታዎች የሚያጋጥሟቸው ሴቶች ይህ የወሊድ መቆጣጠሪያ መድሀኒት ላይታዘዝላቸው ይችላሉ። ይህም የሚደረገው ይህ መድሀኒት እነዚህን በሽታዎች እንደገና ሊቀሰቅሱ ወይም ሊያባብሱ ስለሚችሉ ነው። ስለዚህም ስለወሊድ መቆጣጠሪያ ከጤና ባለሙያ ጋር ሲነጋገሩ ያለብዎትን የጤና እክል በግልጽ ያማክሩ

- የኩላሊት በሽታ (Renal impairment)
- አድሬናል ህመም (Adrenal insufficiency)
- የደም መርጋት በሽታ (Thrombotic diseases) ወይም ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ሁኔታዎች ካሉ
 - ሲጃራ የምታጨስ (ትምባሆ የምትጠቀም) እና ከሰላሳ አምስት አመት እድሜ በላይ ከሆነች
 - የልብ ደምስር በሽታ (Coronary artery disease) ለምሳሌ የልብ በሽታ (heart attack)
 - የአንጎል ደምስር በሽታ (Cerebrovascular disease) ለምሳሌ ስትሮክ
 - በዘር የሚመጣም ሆነ ሌላ አይነት ቶሎ ደም የመጓጓዣ የሚያስከትሉ በሽታዎች (Hypercoagulopathies)
 - በስኳር በሽታ ምክንያት የመጣ የደምስር በሽታ (Diabetes with vascular disease)
 - በህክምና ሊስተካከል ያልቻለ ከፍተኛ ደም ግፊት
 - ማይግሬን (Migraine) ወይም የራስምታት ያለባት ሆኖ ከሰላሳ አምስት አመት እድሜ በላይ ከሆነች



- ምክንያቱ ያልታወቀ ከወር አበባ ጋር ያልተገናኘ የሚሆን ደም መፍሰስ
- የጡት ካንሰር ወይም በኤስትሮጅን ወይም በፕሮጀስቲን ምክንያት ሊባባስ የሚችል ካንሰር
- የጉበት እጢ (Liver tumor)

ትክክለኛ አወሳሰድ

ይህን መድሀኒት ለመጀመር ሁለት አማራጮች አሉ፡-

1. የመጀመሪያውን ቢጫ ከኒን የወር አበባ በሚታይበት የመጀመሪያው ቀን በመዋጥ መጀመር ይቻላል። ከዛ ቀጥሎ ላሉት ሃያ አንድ ቀናት አንድ ቢጫ ከኒን በቀን አንድ ጊዜ ይወሰዳል። ለሚቀጥሉት ሰባት ቀናት (ማለትም የወር አበባ ከታየበት ከሃያ ሁለተኛው እስከ ሀያ ስምንተኛው ቀን) አንድ ነጭ ከኒን በቀን አንድ ይዋጣል። በሀያዘጠነኛው ቀን አንድ ቢጫ ከኒን በመውሰድ የሚቀጥለውን ወር መጀመር ይቻላል። በዚህ መንገድ የጀመረች ሴት ለመጀመሪያው ሳምንት የወሊድ መቆጣጠሪያ አያስፈልጋትም።
2. ሌላኛው መንገድ የመጀመሪያውን የወሊድ መቆጣጠሪያ ቢጫ ከኒን የወር አበባ ቢታየበት ሳምንት የመጀመሪያው እሁድ መዋጥ ይቻላል። ቀጥሎ ላሉት ሃያ አንድ ቀናት አንድ ቢጫ ከኒን በቀን አንድ ጊዜ ይወሰዳል። ለሚቀጥሉት ሰባት ቀናት አንድ ነጭ ከኒን በቀን አንድ ይዋጣል። በሀያ ዘጠነኛው ቀን አንድ ቢጫ ከኒን በመውሰድ የሚቀጥለውን ወር መጀመር ይቻላል። በዚህ መንገድ መጀምር ቅዳሜ እና እሁድ የወር አበባ እንዳይታይ ይረዳል። ነገር ግን በመጀመሪያው ሳምንት ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል።

መድሀኒቱን ምሽት ላይ ከምግብ በሁዋላ ወይም ከመኝታ በፊት መውሰድ ይመረጣል። ይህን መድሀኒት ከምግብ ጋር ወይም ያለምግብ መውሰድ ይቻላል።

ከኒን መውሰድ ከተጀምረ በሁዋላ የሚከሰቱ ነገሮች እና መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች

ነጭ ከኒን ለሰባት ቀናት ከተወሰደ በሁዋላ የወር አበባ ቢቆምም ባይቆምም በማግስቱ ቢጫ ከኒን መውሰድ አለበት።

የመጨረሻው ቢጫ ከኒን ከተወሰደ በሁዋላ ከሰባተኛው ቀን አንስቶ ለተወሰነ ጊዜ ደም ሊታይ ይችላል። ይህም መጠኑ እንደወር አበባ ያህል ሊሆን ወይም ትንሽ ደም መታየት ብቻ ሊሆን ይችላል። ይህም የተለመደ የመድሀኒቱ ባህሪ ስለሆነ ከኒንን መቆጠል ይቻላል። ነገር ግን ይህ ከተለመደው በላይ ከባድ ከሆነ ለሀኪም ማማከር ይኖርባታል።

ይህ ደም በዚህ ጊዜ ወይም ነጭ ከኒኖችን በምትወስድበት ጊዜ ካልታየ የእርግዝና ምልክት ሊሆን ይችላል። በተለይ ይህ የሚሆነው መድሀኒቱን በየእለቱ መዋጥ የማይቻልበት አጋጣሚ ሲፈጠር ወይም ሲረሳ ነው። ይህን መድሀኒት የምትወስድ ሴት እንደጸናለች ከጠረጠረች ወይም ሄዳ ማረጋገጥ አለባት። ነገር ግን ለሁለት ወር ይህ ደም ካልታየ እና መድሀኒቱን በሚገባ በየእለቱ የምትውጥ ከሆነ ያልተጠበቀ እርግዝና ይሆናል ብላ መፍራት የለባትም።

ላልተጠበቀ እርግዝና ላለመጋለጥ

መድሀኒቱን መውሰድ ከጀመሩ አንስቶ ለሚከተሉት ሰባት ቀናት ሌላ ተጨማሪ የወሊድ መከላከያ (ለምሳሌ ኮንዶም) መጠቀም ይመከራል። በተለይ የመጀመሪያው ቢጫ ከኒን የወር አበባ ቢታየበት የመጀመሪያ ቀን ካልተወሰደ ይህ መድሀኒት ለመጀመሪያዎቹ ሰባት ቀናት ከእርግዝና አይከላከልም።

መድሀኒቱን የጤና ባለሙያ እንደመከረም ሳይረሱ በየእለቱ በተመሳሳይ ሰአት ይውሰዱ።

የጤና መታወክ በሚኖርበት ጊዜ አንድ ሴት ይህን መድሀኒት ከወሰደች እስከ ሶስት ሰአት ባለው ጊዜ ውስጥ ካስመለሳት የቀኑን ከኒን እንዳልዋጡ መቁጠር አለባት። እንዲህ ባለው ጊዜ ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ (ለምሳሌ ኮንዶም) መጠቀም አስፈላጊ ነው።

መድሀኒቱን መዋጥ ከረሳሁ ምን ማድረግ አለብኝ?

ይህ መድሀኒት የሚሰራው በየእለቱ በተመሳሳይ ሰአት ከተወሰደ ነው። ነገር ግን ከኒንን ለመውሰድ የማይቻልበት አጋጣሚ ከተፈጠረ ወይም መዋጥ ከረሱ የሚከተለውን ያንብቡና ጥንቃቄ ያድርጉ

- አንድ ቢጫ ከኒን መዋጥ ከረሱ
 - እንዳስታወሱ የረሱትን ከኒን ይዋጡ።
 - የሚቀጥለውን ከኒን በሰአቱ ይዋጡ። ተጨማሪ የእርግዝና መከላከላከያ መጠቀም አስፈላጊ አይደለም።
- ቢጫ ከኒን በሚውጡበት የመጀመሪያ ወይም ሁለተኛ ሳምንት ውስጥ ለተከታታይ ሁለት ቀን ከኒን መዋጥ ከረሱ



- እንዳስታወሱ ሁለት ክንን ይዋጡ። በሚቀጥለው ቀን የሚቀጥሉትን ሁለት ክንኖች ይዋጡ።
- ከዚህ በሁዋላ በተለመደው ሰአት አንድ ክንን በየእለቱ ይዋጡ።
- ሁለት ቢጫ ክንን መዋጥ ከረሱበት ቀን አንስቶ ለሚቀጥሉት ሰባት ቀኖች እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህም ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል።
- ቢጫ ክንን በሚውጡበት ሰባትኛ ወይም አራተኛ ሳምንት ውስጥ ለተከታታይ ሁለት ቀን ክንን መዋጥ ከረሱ
 - መድሀኒቱን የጀመሩት የወር አበባ በታየበት የመጀመሪያው ቀን ከሆነ
 - የቀረዎትን ወራዊ ክንኖች ይጣሉ።
 - እንደአዲስ (ከአዲስ ብሊስተር ካርድ) አንድ ቢጫ ክንን በተለመደው ሰአት በመውሰድ ይጀምሩ።
 - መድሀኒቱን የጀመሩት የወር አበባ በታየበት የመጀመሪያው እሁድ ቀን ከሆነ
 - መድሀኒቱን ከረሱበት ቀን አስቶ እስከሚቀጥለው እሁድ ድረስ የቀረውን ክንን በቀን አንድ ይዋጡ።
 - እሁድ ሲደርስ የቀረውን ወራዊ ክንኖች ይጣሉ እና እንደአዲስ (ከአዲስ ብሊስተር ካርድ) አንድ ቢጫ ክንን በተለመደው ሰአት በመውሰድ ይጀምሩ።
 - ሁለት ቢጫ ክንን መዋጥ ከረሱበት ቀን አንስቶ ለሚቀጥሉት ሰባት ቀኖች እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህም ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል።
- በየትኛውም ሳምንት ውስጥ ሰባት ቢጫ ክንኖችን መዋጥ ከረሱ
 - መድሀኒቱን የጀመሩት የወር አበባ በታየበት የመጀመሪያው ቀን ከሆነ
 - የቀረዎትን ወራዊ ክንኖች ይጣሉ።
 - እንደአዲስ (ከአዲስ ብሊስተር ካርድ) አንድ ቢጫ ክንን በተለመደው ሰአት በመውሰድ ይጀምሩ።
 - መድሀኒቱን የጀመሩት የወር አበባ በታየበት የመጀመሪያው እሁድ ቀን ከሆነ
 - መድሀኒቱን ከረሱበት ቀን አስቶ እስከሚቀጥለው እሁድ ድረስ የቀረውን ክንን በቀን አንድ ይዋጡ።
 - እሁድ ሲደርስ የቀረውን ወራዊ ክንኖች ይጣሉ እና እንደአዲስ (ከአዲስ ብሊስተር ካርድ) አንድ ቢጫ ክንን በተለመደው ሰአት በመውሰድ ይጀምሩ።
 - ሁለት ቢጫ ክንን መዋጥ ከረሱበት ቀን አንስቶ ለሚቀጥሉት ሰባት ቀኖች እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህም ተጨማሪ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል።
 - ለተከታታይ ሁለት ወሮች የወር አበባ ካላዩ የእርግዝና ምልክት ሊሆን ስለሚችል ወደሀኪም ቤት ሄደው ያረጋግጡ።
- ሰባቱን ነጭ ክንኖች በሚወስዱበት ቀኖች ክንን መዋጥ ከረሱ
 - የረሱትን ክንን ይጣሉ።
 - የሚቀጥለውን ክንን በተለመደው ሰአት ይዋጡ።
 - ተጨማሪ የእርግዝና መከላከላከያ መጠቀም አስፈላጊ አይደለም።
- ምን ያህል ቀኖች መዋጥ እንደረሱ ከዘነጉ ወይም ምን ማድረግ እንዳለብዎት እርግጠኛ ካልሆኑ ለጤና ባለሙያ ያማክሩ።

በዚህ መድሃኒት ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ችግሮች (Side effects)

ይህን መድሀኒት የሚወስዱ አንዳንድ ሴቶች የሚከተሉት የጤና እክሎች ሊገጥማቸው ይችላሉ፡-

- የወር አበባ ግዜ የሚታይ አይነት ህመም
- ራስምታት
- የጡት ህመም
- ማቅለሽለሽ/ማስመለስ
- የሆድ ህመም
- የመደበት ስሜት
- የወር አበባ መቅረት መቀነስ ወይም መጨመር
- የሰውነት ማሳከክ
- ብጉር
- ማድያት (Melasma)
- የእግር ማበጥ



- የአይን ህመም
- የሰውነት ክብደት መጨመር
- የወገብ ህመም
- ያልተለመደ ቢሆንም ከአንድ ዓይነት ግዜ ለመጸነስ አለመቻል በአንዳንድ ሴቶች ላይ ታይቷል።

እነዚህ ምልክቶች መድሀኒቱን ሰውነትዎ ሲላመደው የማይቀንስ ከሆነ ወይም ምልክቶቹ ከሚችሉት በላይ ከሆነ ለሀኪምዎ ይነገሩ።

በተጨማሪም በዚህ መድሀኒት ምክንያት የሚከተሉት ህመሞች በጥቂት ሴቶች ላይ ሊከሰት ይችላል።

- ቪን ውስጥ ደም የመጓጎል (Venous thromboembolism) :- ይህ ደም መጓጎል የእግር (Deep vein thrombosis) ወይም የሳንባ (pulmonary embolism) ደምስሮች ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። ይህን ለመከላከል ይህን መድሀኒት ከመጀመርዎ በፊት ከዚህ በፊት የደም ማቅጠኛ መድሀኒት ይወስዱ ከነበረ ወይም በእናት በአባትዎ እንዲህ አይነት በሽታ ካለ ለሀኪምዎ ይነገሩ።
- የደም ግፊት መጨመር (High blood pressure) :- ይህ የሚሆነው በተለይ እድሜ ሲጨምር እና ለረጅም ግዜ ይህን መድሀኒት የተቀመጡ ሴት ስትሆን ነው። በዚህ ምክንያት የሚመጣን ከፍተኛ ደም ግፊትን ለመከላከል በየግዜው የደም ግፊትን መለካት ይመከራል። ደም ግፊቷ በተተደጋጋሚ ከ 120 በ 80 በላይ ሆኖ ከተገኘ ከሀኪም ጋር በመማከር አስፈላጊ ጥንቃቄ ማድረግ ይቻላል።

ይህ መድሀኒት የሀኪም ክትትል ያስፈልገዋል?

ይህን መድሀኒት የምትወስድ ሴት ቢያንስ በየአመቱ የሀኪም ክትትል እንድታደርግ ይመከራል። ይህን ማድረግ በዚህ መድሀኒት የተነሳ ሊመጡ የሚችሉ ህመሞች ሳይከቱ በፊት ለማወቅ እና የሚያስፈልገውን ጥንቃቄ ለመውሰድ ይረዳል።

ሌሎች ጥንቃቄዎች

በዚህ መድሀኒት ውስጥ የሚገኘው ፕሮጀስቲን በሰውነት ውስጥ የሚገኘውን የፓታስቲን መጠን እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል። ይህ የሚያጋጥመው ሌሎች የፓታስቲን መጠን የሚጨምር መድሀኒት የሚወስዱ ወይም ህመም ያጋጠማቸው ሴቶች ላይ ነው። ይህ ፓታስቲን በሰውነት ውስጥ ከሚያስፈልገው በላይ ሲጨምር ለጤና አደጋ ሊፈጠር ይችላል። ይህን መድሀኒት ሲወስዱ በጤናዎ ላይ ለውጥ ካለ ወይም እዲስ መድሀኒት ከታዘዘልዎ በአፍ የሚወሰድ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንደሚጠቀሙ ለሀኪምዎ መነገር ያስፈልጋል። ሀኪምዎ ለፓታስቲን መጨመር የተጋለጡ መሆንዎን ከገመተ የደም ፓታስቲን ለመገምገም ላብራቶሪ ምርመራ ሊያዘልዎ ይችላል።

ፓታስቲን ሊጨምሩ የሚችሉ መድሀኒቶች መካከል እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው

- ስቴሮይድ ነክ ያልሆኑ አንቲኢንፍላሚቶሪ መድሀኒቶች (NSAIDs) (ለረጅም ግዜ በተከታታይ ሲወሰዱ)
 - አይቢፕሮፊኔን (ibuprofen) ሞትሪን (Motrin) አድቪል (Advil)
 - ናፕሮክሲን (Naproxen) አሊቭ (Aleve) እና ሌሎች
- አንዳንድ ውሀ ከሰውነት እንዲወጣ የሚረዱ መድሀኒቶች (Potassium-sparing diuretics)
 - ስፓይሮኖላክቶን (Spironolactone)
 - አምሎራይድ (Amiloride)
 - ኢፕሊሮኖን (Eplerenone)
 - ትራይአምተሪን (Triamterene)
- በመድሀኒት መልክ የተዘጋጀ ፓታስቲን
- አንጅዮቴንሲን ሁለት ሪሰፕተር አንታጎኒስቶች (Angiotensin-II receptor antagonists)
 - ኮዛር (Cozaar)
 - ዳዮቫን (Diovan)
 - ኤቫፕሮ (Avapro) እና ሌሎች
- አንጂዮቴንሲን ቀያሪ ኢንዛይም ኢንሂቢተሮች (ACE inhibitors)
 - ካፖቴን (Capoten)
 - ቫሶቴክ (Vasotec)
 - ዘስትሪል (Zestril) እና ሌሎች
- ሄፓሪን (Heparin)
- አልደስትሮን አንታጎኒስቶች (Aldosterone antagonists)



መድሃኒቱ መቀመጥ ያለበት ቦታ

መድሃኒትዎን፤ ሙቀት እና ቅዝቃዜ የማይበዛበት፤ ደረቅ ቦታ ያስቀምጡ። መድሃኒትን መታጠቢያ ቤት ማስቀመጥ አግባብ አይደለም። ህጻናት እና የቤት እንስሳት የማይደርሱበት ቦታ ያስቀምጡ።

ከፍተኛ ጥንቃቄ (Black Box Warning)

ሲጃራ የሚያጨሱ ሴቶች ይህን መድሃኒት ሲጠቀሙ አደገኛ ለሆነ የልብ እና ደምስር በሽታ ይጋለጣሉ። በተለይ እድሜ ሲጨምር ለበሽታው የመጋለጥ እድሉ እየሰፋ ይሄዳል። ከሰላሳ አምስት አመት እድሜ በላይ እና ሲጃራ የሚያጨሱ ከሆኑ ይህን መድሃኒት እንዳይጠቀሙ ኤፍ.ዲ.ኤ (FDA) ያሳስባል።

ማጣቀሻ

OCELLA 28 TABLETS [package insert]. Wayne, NJ 07470: Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc; 2010.
YASMIN [package insert]. Wayne, NJ 07470: Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc; 2012.

ቀን: 07/23/20