



# ግልምፕራይድ (Glimepiride)

የመድሃኒት ስም ጀነሪክ:- ግልምፕራይድ (Glimepiride)


የብራንድ ስም:- አማሪል (Amaryl)

ምድብ:- ሰልፎንይልዩራ (Sulfonylurea)

**ግልምፕራይድ ለምን ይታዘዛል?**

በአይነት ሁለት ስኳር በሽታ ህመምተኞች ላይ የሚታየውን ከፍተኛ የደም ግሉኮስን ለማስተካከል ይረዳል።

**ግልምፕራይድ በምን መልኩ ይመረታል?**

 ግልምፕራይድ በአፍ የሚዋጥ ኪኒን ነው። በ1 በ2 እና በ 4 ሚ.ግ(mg) ክኒን መጠን ይመረታል።

**ግልምፕራይድ እንዴት ነው የሚሰራው?**

አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ያለበት ሰው ኢንሱሊን የሚያመርተው የጣፍያ ህዋሶች (beta cells of pancreatic islet) ይደክማሉ። እነዚህ ህዋሶች ኢንሱሊን የማምረት አቅማቸው ዝቅተኛ ይሆናል። ኢንሱሊን ከሌለ በደም ውስጥ ያለው ግሉኮስ ወደሚያስፈልገው የሰውነት ክፍል መሄድ አይችልም። በዚህ ምክንያት በደም ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን እየተጠራቀመ እና እየጨመረ ይሄዳል።

ግልምፕራይድ እነዚህን የተዳከሙ እንዲሁም የተቀሩትን ጤናማ የጣፍያ ህዋሶች የተሻለ መጠን ያለው ኢንሱሊን እንዲያመርቱ ያደርጋቸዋል። ይህ ኢንሱሊን በደም ውስጥ ያለው ግሉኮስ ወደሚያስፈልገው የሰውነት ክፍል ውስጥ እንዲገባ በማድረግ የደም ግሉኮስ መጠንን እንዲቀንስ ያደርጋል።

**ከመጠቀምዎ በፊት ማወቅ ያለብዎት ምንድነው?**

ይህ መድሃኒት የሚሰራው ህኪም ባዘዘው መሰረት በየእለቱ ሲወሰድ ነው።

ከመድሃኒቱ በተጨማሪ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ እና አመጋገብ ማስተካከል የስኳር በሽታን ለመቆጣጠር ትልቅ አስተዋጾ አለው።

ይህ መድሃኒት የደም ግሉኮስን ያስተካክላል እንጂ የስኳር በሽታን አይፈውስም። የስኳር በሽታ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ህመም ነው። የህክምናው አላማ የደም ግሉኮስን በመቀነስ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች (ለምሳሌ ኩላሊት እና አይን) ላይ የሚያደርሰውን በሽታ መከላከል ነው። የደም ግሉኮስ ሲቀንስ ይህን መድሃኒት መውሰድ ማቆም የደም ግሉኮስ ተመልሶ እንዲጨምር ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ የደም ግሉኮስ ቢስተካከል ወይም ጤንነት ቢሰማ እንኳን ይህን መድሃኒት ያለህኪም ምክር ማቆም ትክክል አይደለም።

**የመድሃኒት መስተጋብር**

**መድሃኒቶች:-** እንዳንድ መድሃኒቶች ከግልምፕራይድ ጋር ሲወሰዱ የጎን ጉዳቱን ሊያባብሱት እንዲሁም የመድሃኒቱ እንዳይሰራ ሊያደርጉት ይችላሉ። ከነዚህም መካከል ያለህኪም ትእዛዝ የሚወሰዱ የህመም ማስታገሻዎች አድቪል (Advil) እና አሊቭ (Aleve) ይገኙበታል። ግልምፕራይድ እየወሰዱ አዲስ መድሃኒት ሲጀምሩ ህኪም ወይም ፋርማሲስት በማማከር ለጎን ጉዳት (side effect) እንዳይጋለጡ ጥንቃቄ ያድርጉ።

**አልኮል:-** እንደብዙ መድሃኒቶች ሁሉ ይህን መድሃኒት ሲወስዱ አልኮል መጠጥ መጠጣት አይመከርም።

**ምግቦች:-** ይህን መድሃኒት ሲወስዱ ጣፋጭ የሆኑ እንዲሁም ከፍተኛ ካርቦህይድሬት (carbohydrate) ያላቸውን ምግቦች (ለምሳሌ ዳቦ፣ ፓስታ፣ ጣፋጭ ፍራፍሬዎ) ይቀንሱ። ለስኳር በሽታ ተስማሚ የሆነ የአመጋገብ መከተል ለመድሃኒቱ መስራት እና ለአጠቃላይ ጤንነት ጥሩ ነው።



**እርጉዝ ሴቶች፦** ይህ መድሃኒት በእርግዝና ጊዜ ከእናት ወደጽንሰ ሊተላለፍ ይችላል። ነገር ግን ይህ መድሃኒት በፅንሰ ላይ ጉዳት ማድረሱን ለማወቅ የሚያስችል ሰፊ ጥናት የለም። በእርግዝና ጊዜ የስኳር በሽታን መቆጣጠር ለእናትም ሆነ ለፅንሱ ጤንነት አስፈላጊ ነው። ይህን መድሃኒት የምትወስድ ሴት መፀነሷን ስታውቅ መድሃኒቱን ላዘዘላት ሀኪም እንድታሳውቅ ይመከራል።

**የሚያጠቡ ሴቶች፦** በእንስሳት ላይ በተደረገ ጥናት መሰረት ግልምፕራይድ የምትወስድ እናት ጡት ወተት ውስጥ መድሃኒቱ ሊኖር ይችላል። በሰዎች ላይ ይህ መድሃኒት በጡት ወተት እንዳለ ወይም እንደሌለ አይታወቅም(1)። ስለአማራጭ መድሃኒቶች ወይም ማድረግ ስላለብዎት ጥንቃቄ ሀኪምዎን ያማክሩ።

**ይህ መድሃኒት የማይታዘዝላቸው ሰዎች (Contraindication)**

1. ከዚህ በፊት ይህን መድሃኒት ወስደው አደገኛ አለርጂ ያጋጠማቸው ሰዎች።
2. ከስኳር በሽታ ጋር የተያያዘ ኪቶአሲዶሲስ (diabetic ketoacidosis) ያጋጠማቸው ሰዎች።

**የግልምፕራይድ አወሳሰድ**

የሀኪም ትእዛዝ ይከተሉ።

በቀን የመጀመሪያው የመብል ሰአት ላይ ከምግብ ጋር መውሰድ ይቻላል።

መድሃኒቱን የሚወስድበት ሰአት ተመሳሳይ ቢሆን ይመረጣል።

**መድሃኒቱን መዋጥ ከረሳሁ ምን ማድረግ አለብኝ?**

ወድያው እንዳስታወቁ ይውሰዱ። ብዙ ሰአት ካለፈ ይተውት እና በሚቀጥለው የመድሃኒት መውሰጃ ጊዜ የተለመደውን መጠን ይዋጡ። የረሱትን ጨምረው ለመዋጥ አይሞክሩ። ለሀኪምዎ ሳያማክሩ ድንገት መድሃኒትዎን መውሰድ አያቁሙ።

**የጎን ጉዳት (Side-effect)**

ይህን መድሃኒት የሚወስዱ አንዳንድ ሰዎች የማዘር ስሜት፣ ድካም፣ የራስ ምታት እና ማቅለሽለሽ ሊሰማቸው ይችላል። ሌሎች ሊታዩ የሚችሉ የጎን ጉዳቶች ቆዳ ማሳከክ፣ ሽፍታ እና የአይን ብዥታ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ እነዚህ ምልክቶች መድሃኒቱን መውሰድ ሲጀምሩ የሚታዩ እና ሰውነት ሲላመድ የሚጠፉ ናቸው። መድሃኒቱን ከዋጡ በሁዋላ ምግብ መብል ሊረዳ ይችላል። የማይተዎት እና ከአቅም በላይ ከሆነ ለሃኪም ያማክሩ።

ይህን መድሃኒት ሲወስዱ የሰውነት ክብደት መጨመር ሊታይ ይችላል።

ስለሀይፖግላይሴሚያ (Hypoglycemia) “ሌሎች ጥንቃቄዎች” በሚለው ርዕስ ስር ያንብቡ።

**ለዚህ መድሃኒት የሃኪም ክትትል ያስፈልገኛል?**

የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች የሀኪም ቤት ቀጠሮ መከታተል ያስፈልጋቸዋል። ይህን የሚደረገው

1. የታዘዘላቸው መድሃኒት ስኳር በሽታቸውን ለመቆጣጠር እየረዳቸው መሆኑን ለማወቅ
2. በመድሃኒቱ ምክንያት የሚመጡ የጎን ጉዳቶች እየተባባሱ እንዳልሆኑ ለማወቅ
3. በስኳር በሽታ ምክንያት የሚመጡ ሌሎች ህመሞች (ለምሳሌ የኩላሊት በሽታ) ካሉ በጊዜ ለማወቅ እና የሚያስፈልገውን ህክምና ለማድረግ ነው።

በተጨማሪ የአይነቱ ሁለት የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ከጊዜ በሁዋላ ጣፊያቸው ሙሉ በሙሉ ኢንሱሊን የማምረት ችሎታውን ሊያጣ ይችላል። በዚህ ጊዜ ይህ መድሃኒት አይሰራም። ይህን በምርመራ አረጋግጦ ሃኪማቸው ከግልምፕራይድ ወደሌላ መድሃኒት ሊለውጥላቸው ይችላል። ስለዚህ የህክምና ቀጠሮ መከታተል ጥሩ ነው።

**ሌሎች ጥንቃቄዎች**

መጀመሪያ የሚታዘዘው መድሃኒት መጠን የደም ግሉኮስን ወይም ኤዋንሲን (A1C) ላያስተካክል ይችላል። ስለዚህ ሀኪም ይህን መድሃኒት በትንሽ መጠን ጀምሮ ቀስ በቀስ እየጨመረ መሄድ ይፈልግ ይሆናል። የስኳር በሽታን መቆጣጠር እስከሚቻል ድረስ የመድሃኒቱ መጠን እያስተካከሉ መሄድ የመድሃኒቱን የጎን ጉዳት (side-effect) ለመቀነስ እና ለሀመምተኛው የሚሆነውን ትክክለኛውን የመድሃኒት መጠን ለማግኘት ይጠቅማል።



**ሀይፓግላይሰሚያ (Hypoglycemia)**:- አንዳንድ ሰዎች ግልምፕራይድ ሲወስዱ የደም ግሉኮሳቸው መጠን ከሚፈለገው በታች ሊወርድ ይችላል።

የደም ግሉኮስ ሲለካ ከ70 በታች ሲሆን ወይም አንዳንድ የህመም ምልክቶች ሲታዩ የደም ግሉኮስ ከሚፈለገው በታች ነው (Hypoglycemia) ይባላል። እንደከፍተኛ የደም ግሉኮስ ሁሉ ይህ የደም ግሉኮስ በጣም ዝቅ ማለት ለጤና አደገኛ ሊሆን ይችላል።

ይህን የጎን ጉዳት ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች መድሀኒቱን ያለምግብ መውሰድ፣ በቂ ምግብ አለመመገብ፣ እና ሌሎች አንዳንድ መድሀኒቶች ናቸው።

ዋና ዋና የህመም ምልክቶቹ የረሀብ ስሜት፣ ያለተለመደ ግራ መጋባት (confusion)፣ ራስ ማዞር፣ የሰውነት መዛፈ፣ የመንቀጥቀጥ ስሜት፣ በላብ መጠመቅ፣ የልብ በሀይል መምታት፣ እንዲሁም ከባለ እራስን መሳት ናቸው።

እነዚህ ምልክቶች የተሰማው ሰው ማድረግ ያለበት ነገሮች የሚከተሉት ናቸው

1. ከተቻለ የደም ግሉኮስ መለካት
2. ይህ ካልተቻለ ወይም ተለክቶ የደም ግሉኮስ ከ70 በታች ከሆነ ስኳርነት ያለው ምግብ ወይም መጠጥ መውሰድ። ለምሳሌ የግሉኮስ ታብሌት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ ከረሜላ፣ ግማሽ ብርጭቆ የብርቱካን ጭማቂ ወይም አንድ ብርጭቆ ወተት መውሰድ ይቻላል።
3. ከ15 ደቂቃ በሁዋላ የደም ግሉኮስ ከ70 በላይ መሆኑን ለማረጋገጥ ደግሞ መለካት።
4. ተለክተው ከ70 በላይ ከሆነ ቀለል ያለ ምግብ መመገብ
5. ተለክተው አሁንም ከ70 በታች ከሆነ እንደገና ጣፋጭነት ያለው ምግብ መብላት እና ወደሀኪም ቤት መሄድ።
6. ይህ አንዴ ካጋጠመ የስኳር በሽታዎን ለሚከታተል ሀኪምዎ መንገር አይርሱ።

የልብ ወይም የደም ስር በሽታ ላለበት ሰው ከግልምፕራይድ የተሻለ መድሀኒት ሊኖር ይችላል። መድሀኒት ለሚያዘልዎት ሀኪም ከዚህ በፊት የልብ ወይም የደም ስር በሽታ አጋጥሞት ከነበረ መንገር አይዘንጉ።

**መድሃኒቱ መቀመጥ ያለበት ቦታ**

ይህ መድሀኒት የሚቀመጥበት ቦታ ሙቀት፣ ቅዝቃዜ እና እርጥበት የማይበዛበት ህጻናት የማይደርሱበት ቦታ ነው።

**ማጣቀሻ**

1. Amaryl[package insert]. Bridgewater, NJ 08807: sanofi-aventis U.S. LLC, Inc.; 2009.
2. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Brunton, Laurence L., et al. Goodman & Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed., McGraw Hill Education, 2011.
3. Diabetes-2020. Diabetes Care. 2020 Jan;43(Suppl 1):S98-S110. doi: 10.2337/dc20-S009. Erratum in: Diabetes Care. 2020 Aug;43(8):1979. PMID: 31862752.
4. "Diabetes Mellitus." *Pharmacotherapy Handbook*, by Barbara G. Wells et al., McGraw-Hill Education, 2017, pp. 161–175.

ቀን: 01/25/2021