

# አሎግልፕቲን (Alogliptin)

የመድሃኒት ስም ጀነሪክ:- አሎግልፕቲን (Alogliptin)


የብራንድ ስም:- ነሲና (Nesina)

ምድብ:- ዲፐፐ 4 አጋጅ (DPP 4 inhibitor)

## አሎግልፕቲን ለምን ይታዘዛል?


በእይነት ሁለት ስኳር በሽታ ህመምተኞች ላይ የሚታየውን ከፍተኛ የደም ግሉኮስን ለማስተካከል ይረዳል።

## አሎግልፕቲን በምን መልኩ ይመረታል?

 አሎግልፕቲን በአፍ የሚዋጥ ኪሊን ነው። ብዙ ጊዜ በ25፣ 12.5 ፣ እና 6.25 ሚሊግራም መጠን ይመጣል።

## አሎግልፕቲን እንዴት ነው የሚሰራው?

አንድ ሰው ምግብ ሲበላ ወይም የደም ግሉኮስ ከፍ ሲል ኢንክሪቲን የሚባሉ ሆርሞኖች አንጀት አከባቢ ይመነጫሉ። ኢንክሪቲኖች በጣፊያ ውስጥ የኢንሱሊን ምርት እንዲጨምር እንዲሁም የግሉኮስን ምርት እንዲቀንስ ምልክት ይሰጡታል። የኢንሱሊን መጠን መጨመር በደም ያለውን የግሉኮስ መጠን ይቀንሳል። በአንጻሩ ከጣፊያ የሚመረተው እና የሚመነጨው የግሉኮስን መጠን መቀነስ በጉቦት ውስጥ ተከማችቶ የሚቀመጠውን ግላይኮጅን ወደግሉኮስ ተለውጦ ወደደም ዝውውር እንዲያገባ ያደርገዋል። ስለዚህ የኢንሱሊንን ምርት በመቆጣጠር ኢንክሪቲኖች የደም ግሉኮስን ይቀንሳሉ። የደም ግሉኮስ የሚፈለገውን ያህል ዝቅ ካለ በኋላ ዲፐፐ 4 የሚባሉ ኢንክሪቲኖች ኢንክሪቲን በሚገኝበት የአንጀት አከባቢ ይመነጫሉ። ኢንክሪቲኖችን በመሰባበር ለጣፊያ የሚሰጡትን ምልክት እንዲያቆም ያደርጋሉ።



ኢንክሪቲኖች ከአንጀት መንጭታው በዲፐፐ 4 እስከሚሰበሰቡ ድረስ የደም ግሉኮስ በሰውነት እንዲስተካከል ያደርጋሉ። ዲፐፐ 4 ን የሚያግዱ መድሃኒቶች የኢንክሪቲን ሆርሞኖች ቶሎ እንዳይሰባበሩ ያደርጋሉ።

ይህ መድሃኒት ዲፐፐ 4 ኢንክሪቲኖችን እንዳይሰባበሩ በማድረግ ኢንክሪቲኖች ለረጅም ጊዜ በሰውነት እንዲቆዩ ያደርጋሉ። ኢንክሪቲኖች ለረጅም ጊዜ በሰውነት መቆየት የኢንሱሊን ምርት እንዲቀጥልና የግሉኮስን ምርት እንደቀነሰ እንዲቆይ ያደርጋሉ። የዚህ አጠቃላይ ውጤት በደም ውስጥ የሚገኘው የግሉኮስ መጠን ማስተካከል ይሆናል።

## የአሎግልፕቲን አወሳሰድ

- የህኪም ትእዛዝ ይከተሉ።
- ብዙ ጊዜ በቀን አንድ ጊዜ ይወሰዳል።
- መድሃኒቱ የሚወሰድበት ሰዓት ተመሳሳይ ቢሆን ይመረጣል።
- ከምግብ ጋር ወይም ያለምግብ ብቻውን መውሰድ ይቻላል።

## መድሃኒቱን መዋጥ ከረሳሁ ምን ማድረግ አለብኝ?

ወድያው እንዳስታወቁ ይውሰዱ። ብዙ ሰዓት ካለፈ ግን ይተውት እና በሚቀጥለው የመድሃኒት መውሰጃ ጊዜ የተለመደውን መጠን ይዋጡ። የረሱትን ጨምረው ለመዋጥ አይሞክሩ።።

### የመድሀኒቱ የጎን ጉዳት (Side-effect)

ይህን መድሀኒት የሚወስዱ አንዳንድ ሰዎች ላይ እነዚህ የህመም ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ-

- እንደጉንፋን (Nasopharyngitis) ያለ ህመም (ከአፍንጫ የሚወጣ ፈሳሽ (ንፍጥ)፣ የአፍንጫ መደፈን፣ የጉሮሮ ህመም)
- ራስምታት

ይህ ብዙ ጊዜ መድሀኒቱ ሲጀመር አከባቢ የሚሰማ ህመም ነው። መድሀኒቱ ከሰውነት ጋር ሲላመድ ይተዋል። ካልተወደም ከአቅም በላይ ከሆነ ግን ለሀኪም ያሳውቁ።

### ለዚህ መድሀኒት የሃኪም ክትትል ያስፈልገኛል?

የሰኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች የሀኪም ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ይህም የሚደረገው-

1. የታዘዘላቸው መድሀኒት የደም ግልጽሳቸውን በመቆጣጠር ያመጣውን ውጤት ለማወቅ
2. በመድሀኒቱ ምክንያት የሚመጡ የጎን ጉዳቶች ካለ ለማወቅ
3. በሰኳር በሽታ ምክንያት የሚመጣ ሌላ ህመም (ለምሳሌ የኩላሊት በሽታ) ካለ በጊዜ ለማወቅ እና የሚያስፈልገውን ህክምና ለማድረግ ነው።

### ከመጠቀም በፊት ማወቅ ያለብዎት ምንድነው?

ይህ መድሀኒት የሚሰራው ሀኪም ባዘዘው መሰረት በየእለቱ ሲወሰድ ነው።

ከመድሀኒቱ በተጨማሪ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግና አመጋገብ ማስተካከል የሰኳር በሽታን ለመቆጣጠር ትልቅ አስተዋጾ አለው።

ይህ መድሀኒት የደም ግሉኮስን ያስተካክላል እንጂ የሰኳር በሽታን አይፈውስም። የሰኳር በሽታ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ህመም ነው። የህክምናው አላማ የደም ግሉኮስን በመቀነስ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች (ለምሳሌ ኩላሊት እና አይን) ላይ የሚያደርሰውን በሽታ መከላከል ነው። የደም ግሉኮስ ሲቀንስ ይህን መድሀኒት መውሰድ ማቆም የደም ግሉኮስ ተመልሶ እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ የደም ግሉኮስ ቢስተካከል ወይም ጤንነት ቢሰማ እንኳን ይህን መድሀኒት ያለሀኪም ትእዛዝ አታቁሙ።

### ይህ መድሀኒት የማይታዘዙላቸው ሰዎች፡-

1. ከዚህ በፊት ይህን መድሀኒት ወስደው አደገኛ አለርጂ ያጋጠማቸው ሰዎች
2. አይነት አንድ የሰኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች እንዲሁም
3. ከሰኳር በሽታ ጋር የተያያዘ ኪቶአሲዶሲስ (diabetic ketoacidosis) ያጋጠማቸው ሰዎች።

### የመድሀኒቱ መስተጋብር (Drug Interaction)

**አልኮል፡-** እንደብዙ መድሀኒቶች ሁሉ ይህን መድሀኒት ሲወስዱ አልኮል መጠጥ መጠጣት አይመከርም።

**ምግቦች፡-** ይህን መድሀኒት ሲወስዱ ጣፋጭ የሆኑ እንዲሁም ከፍተኛ ካርቦሀይድሬት (carbohydrate) ያላቸውን ምግቦች (ለምሳሌ ዳቦ፣ ፓስታ፣ ጣፋጭ ፍራፍሬዎ) ይቀንሱ። ለሰኳር በሽታ ተስማሚ የሆነ የአመጋገብ መከተል ለመድሀኒቱ መስራት እና ለአጠቃላይ ጤንነት ጥሩ ነው።

**እርጉዝ ሴቶች፡-** ይህ መድሀኒት በፅንሰ ላይ ጉዳት ማድረሱን ለማወቅ የሚያስችል ሰፊ ጥናት የለም። ስለዚህ ይህን መድሀኒት የምትወስድ ሴት መፀነሷን ስታውቅ መድሀኒቱን ላዘዘላት ሀኪም እንድታሳውቅ ይመከራል።

**የሚያጠቡ ሴቶች፡-** ይህ መድሀኒት በጡት ወተት እንዳለ ወይም እንደሌለ አይታወቅም። ስለአማራጭ መድሀኒቶች ወይም ማድረግ ስላለባቸው ጥንቃቄ ሀኪማቸውን ያማክሩ።

**ሌሎች ጥንቃቄዎች**

የኩላሊት በሽታ ሲኖር የሚወስዱት የመድሀኒት መጠን ሊቀነስ ይችላል። ይህንን ለማወቅ ሀኪም በየጊዜው የኩላሊት ምርመራ ሊታዘዝ ይችላል።

ይህ መድሀኒት የጣፊያ ህመም (pancreatitis) ሊያባብስ ይችላል። የዚህ ህመም ምልክቶች ሀይለኛ የማያቋርጥ እና እስከጀርባ ድረስ የሚሰማ የሆድ ህመም፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ እና ዘይት ያለበት የሚመስል ሰገራ ሊሆን ይችላል። ይህን መድሀኒት እየወሰደ እንዲህ ያለ ህመም የሚሰማው ሰው ለሀኪሙ እንዲያሳውቅ ይመከራል።

አሎግልፕቲን የወሰዱ ጥቂት ሰዎች ላይ የልብ ድካም (heart failure) ታይቷል። ይህንን መድሀኒት ሲወስዱ የልብ ድካም ምልክቶችን ማወቅ ጥሩ ነው። የልብ ድካም ምልክቶች የትንፋሽ ማጠር (በተለይ ጋደም ሲሉ የሚብስ)፣ ያልተለመደ የድካም ስሜት፣ የእግር ወይም የእጅ ማበጥ፣ የሰውነት ክብደት በፍጥነት መጨመር፣ ደረት ላይ ህመም መኖር ምልክቶች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምልክቶች ከታዩ ለሀኪምዎ ይነገሩ።

ይህን መድሀኒት ሲወስዱ የመገጣጠሚያ ህመም (joint pain) ሊሰማ ይችላል። እንዲህ ሀይነት ህመም ካጋጠመ ለሀኪም ማማከር ጥሩ ነው።

ይህን መድሀኒት ሲወስዱ የቆዳ ወይም የአይን (ነጭ ክፍል) ወደቢጫ ከተለወጠ፣ የሽንት ቀለም ከጠቆረ፣ የሰገራ ቀለም ከነጣ፣ ወይም ያልተለመደ ድካም፣ የምግብ ፍላጎት ማጣት፣ ማቅለሽለሽ እና ማስታወክ ካለ ለሀኪም ያማክሩ። እነዚህ የጉበት ህመም ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪ ሀኪም የጉበት ጤንነት ለመርመር በየጊዜው የላብራቶሪ ምርመራ ሊያዝ ይችላል።

አንዳንድ ሰዎች ለዚህ መድሀኒት አደገኛ አለርጂ ሊኖራቸው ይችላል። አናፍላክሲስ (Anaphylaxis)፣ አንጂዮኪዴማ (Angioedema)፣ እና ስቲቨን ጆንሰን (Stevens-Johnson Syndrom) አጣዳፊ ህክምና የሚያስፈልጋቸው አለርጂ አይነቶች ናቸው። የህመም ምልክቶች ከታዩ ሀኪም ጋር መሄድ አስፈላጊ ነው። ዋና ዋና ምልክቶች

- ለመተንፈስ መቸገር
- የፊት የምላስ የከንፈር ወይም የጉሮሮ ማበጥ
- የቆዳ ሽፍታ እና ማሳከክ
- የቆዳ መቅላት
- ውሃ የሚቋጥር ሽፍታ

አሎግልፕቲን ን የሚወስዱ ሰዎች የደም ግሉኮሳቸው ከሚፈለገው በታች ዝቅ ሊል ይችላል። ከሌሎቹ የስኳር በሽታ መድሀኒቶች ሲወዳደር እድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም ምልክቶቹን እና የሚያስፈልገውን ጥንቃቄ ማወቅ ጥሩ ነው።

**ሀይፓግላይሰሚያ (Hypoglycemia)**

የደም ግሉኮስ ሲለካ ከ70 በታች ሲሆን ወይም አንዳንድ የህመም ምልክቶች ሲታዩ የደም ግሉኮስ ከሚፈለገው በታች ነው (Hypoglycemia) ይባላል። እንደከፍተኛ የደም ግሉኮስ ሁሉ ይህ የደም ግሉኮስ በጣም ዝቅ ማለት ለጤና አደገኛ ሊሆን ይችላል።

ይህን የጎን ጉዳት ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች ውስጥ መድሀኒቱን ያለምግብ መውሰድ፣ በቂ ምግብ አለመመገብ፣ እና ሌሎች አንዳንድ መድሀኒቶች ናቸው። እንዲሁም ከ65 አመት በላይ እድሜ ያላቸው ሰዎች ለዚህ ጎን ጉዳት የበለጠ የተጋለጡ ናቸው። ምልክቶቹን ማወቅ እና ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው።

ዋና ዋና የህመም ምልክቶች

- |               |                              |                           |
|---------------|------------------------------|---------------------------|
| • የረሀብ ስሜት    | • ብዥታ                        | • ራስ ማዞር                  |
| • የመንቀጥቀጥ ስሜት | • የሰውነት መዛል                  | • የልብ በሀይል መምታት፣          |
| • በላብ መጠመቅ    | • ያለተለመደ ግራ መጋባት (confusion) | • እንዲሁም ከባለ እራስን መሳት ናቸው። |



እነዚህ ምልክቶች የተሰማው ሰው የሚከተሉትን ማድረግ አለበት

1. ከተቻለ የደም ግልጽነት መለካት
2. ይህ ካልተቻለ ወይም ተለክቶ የደም ግልጽነት ከ70 በታች ከሆነ ስኳርነት ያለው ምግብ ወይም መጠጥ መውሰድ። ለምሳሌ የግሉትስ ታብሌት፣ አንድ ማንኪያ ስኳር፣ ማር፣ ከረሜላ፣ ግማሽ ብርጭቆ የብርቱካን ጭማቂ ወይም አንድ ብርጭቆ ወተት መውሰድ ይቻላል።
3. ከ15 ደቂቃ በሁዋላ የደም ግሉትስ ከ70 በላይ መሆኑን ለማረጋገጥ ደግሞ መለካት።
4. ተለክተው ከ70 በላይ ከሆነ ቀለል ያለ ምግብ መመገብ
5. ተለክተው ከ70 በታች ከሆነ ከ 1 -3 ያሉትን የደም ግሉትስ ከ70 በላይ እስኪሆን ድረስ መደጋገም።
6. የስኳር በሽታዎን ለሚከታተል ህኪምዎ መንገር አይርሱ።

መድሃኒቱ መቀመጥ ያለበት ቦታ

ይህ መድሃኒት ሙቀት ቅዝቃዜ እና እርጥበት በሌለበት ህጻናት በማይደርሱበት ቦታ መቀመጥ አለበት።

**ማጣቀሻ**

1. "Diabetes Mellitus." Pharmacotherapy Handbook, by Barbara G. Wells et al., McGraw-Hill Education, 2017, pp. 161–175.
2. NESINA (alogliptin) tablets, for oral use [package insert]. Deerfield, IL 60015.: Takeda Pharmaceuticals America, Inc.; 2016.