

ሰማግሉታይድ (Semaglutide)

የመድሃኒት ስም ጀነሪክ:- ሰማግሉታይድ

የብራንድ ስም:- አዘምፒክ (Ozempic) ራይበልሰስ (Rybelsus)

ምድብ:- ጂኤልፒ-1 አይነት (GLP-1 Agonist)

ሰማግሉታይድ ለምን ይታዘዛል?

ሰማግሉታይድ በአይነት ሁለት ስኳር በሽታ ህመምተኞች ላይ የሚታየውን ከፍተኛ የደም ግሉኮስን ለማስተካከል ይረዳል።

ሰማግሉታይድ በምን መልኩ ይመረታል?

ይህ መድሃኒት በኪሊን መልኩ (ራይበልሰስ) እና በመርሬ መልኩ (አዘምፒክ) ይመረታል።

1. ራይበልሰስ በ3 በ7 እና በ14 ሚሊግራም በአፍ የሚዋጥ ኪሊን መልኩ ይመረታል።
2. አዘምፒክ
 1. 0.25 ወይም 0.5 ሚሊግራም በአንድ ጊዜ መስጠት በሚችል ፔን መልኩ እና
 2. 1 ሚሊግራም በአንድ ጊዜ መስጠት በሚችል ፔን መልኩ ይመረታል።

ሰማግሉታይድ እንዴት ነው የሚሰራው?

ሰማግሉታይድ በሰውነት ውስጥ የኢንሱሊንን መጠን በመጨመር እና የግሉኮስን መጠን በመቀነስ የደም ግሉኮስን ያስተካክላል።

ሰማግሉታይድ በተፈጥሮ ሰውነት ውስጥ የሚገኘውን ጂኤልፒ-1 እንዲመስል ተደርጎ የተሰራ መድሃኒት ነው። ጂኤልፒ-1 በአንጀት ከሚገኙ ኢንክሪቲን ከሚባሉ ሆርሞኖች መካከል አንዱ ሲሆን የሚጠቅመው ምግብ ከተበላ ብኝላ ከፍ ያለ የደም ግሉኮስን ለማስተካከል ነው። ጂኤልፒ-1 የሚሰራው በሰውነት ውስጥ ከፍተኛ የግሉኮስ መጠን ሲኖር ብቻ ነው። ይህ ካልሆነ ጂኤልፒ-1 በብዛት ቢኖር እንኳን የደም ግሉኮስን የበለጠ ዝቅ አያደርግም።

ጂኤልፒ-1 የደም ግሉኮስን የሚቆጣጠረው አንድም ጣፊያ የኢንሱሊን ምርቱን እንዲጨምር በማድረግ ደግሞም የግሉኮስን ምርቱን እንዲቀንስ በማድረግ ነው። የኢንሱሊን መጠን መጨመር በደም ያለውን የግሉኮስ መጠን ይቀንሳል። የግሉኮስን መጠን መቀነስ ደግሞ በግላይኮጅን መልክ ተከማችቶ የሚቀመጠውን ግሉኮስ ወደደም ዝውውር እንዳይገባ ያደርገዋል። ምግብ ከተበላ ከጥቂት ሰዓት በኋላ ጂኤልፒ-1 እና ሌሎች ኢንክሪቲኖች በዲፒፒ 4 ኢንዛይም ይሰባበራሉ። በዲፒፒ 4 የተሰባበሩ ኢንክሪቲኖች (ጂኤልፒ-1 ን ጨምሮ) የደም ግሉኮስን ማስተካከል አይችሉም።

ሰማግሉታይድ የሚሰራው በተፈጥሮ ከሚገኘው ጂኤልፒ-1 ጋር በተመሳሳይ መንገድ ነው። ነገር ግን በተፈጥሮ እንደሚገኘው ጂኤልፒ-1 በዲፒፒ 4 አይሰባበርም። ስለዚህ በሰውነት ውስጥ ለረጅም ጊዜ መቆየት እና የደም ግሉኮስን ማስተካከል ይችላል።

በተጨማሪ ጂኤልፒ-1 የምግብ መንሸራሸርን ያዘገያል። ይህም የሆድ መሙላት ወይም የመጥገብ ስሜት እንዲሰማ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት በምግብ መልኩ ወደሰውነት የሚገባው የግሉኮስን መጠን ይቀንሳል።

የሰማግሎታይድ አወሳሰድ

1. ራይበልሰስ

የሀኪም ትእዛዝ ይከተሉ።

ከቁርስ ሰላሳ ደቂቃ በፊት በግማሽ ብርጭቆ ውሀ ይዋጣል። መድሀኒቱን ከተዋጠ በኋላ ለ30 ደቂቃ ምግብ ሙብላት የሚጠጣ ነገር መጠጣት ወይም ሌላ መድሀኒት መውሰድ መድሀኒቱ በደንብ እንዳይሰራ ያደርገዋል።

ኪነትን መቁረጥ መፍጨት ወይም ማኘክ ጥሩ አይደለም።

2. አዘምርክ

የሀኪም ትእዛዝ ይከተሉ።

አዘምርክ በቆዳ ስር በሳምንት አንድ ጊዜ የሚወጋ መድሀኒት ነው።

በቀን በማንኛውም ሰዓት መወጋት ይቻላል። ለማስታወስ እንዲመች በየሳምቱ በተመሳሳይ ሰዓት መውሰድ ይመከራል። ምግብ ቢበሉም ባይበሉም አዘምርክን መውሰድ ይቻላል።

የሚወጋበት ቦታ ሆድ ክንድ ወይም ታፋ ላይ ብቻ መሆን አለበት። የሚወጋበት ቦታ መዟዟር አለበት። ማለትም ዛሬ መድሀኒት የሚወጋበት ቦታ ትናንት ከተወጋበት አጠገብ መሆን የለበትም።

ይህ መድሀኒት ከሌላ የሚወጉ መድሀኒቶች ጋር መቀላቀል የለበትም።

ኢንሱሊንና ሰማግሎታይድ አጠገብ ለአጠገብ መወጋት የለበትም።

(የአዘምርክ (ሰማግሎታይድ) ፔን አጠቃቀም በዝርዝር ለማየት ወደጽሁፉ መጨረሻ “የሰማግሎታይድ ፔን አጠቃቀም” የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ)

መድሀኒቱን ከረሳሁ ምን ማድረግ አለብኝ?

ራይበልሰስ፦ የረሱትን የራይበልሰስ ክኒን ይተውት እና በሚቀጥለው የመድሀኒት መውሰጃ ጊዜ የተለመደውን መጠን ይውሰዱ። የረሱትን ጨምረው ለመውሰድ አይሞክሩ።

አዘምርክ፦ መድሀኒት የመውሰጃ ቀን አምስት ቀን እስካላለፈው ድረስ ወድያው እንዳስታወሱ ይውሰዱ። አምስት ቀን ካለፈው ግን ይተውት እና በሚቀጥለው የመድሀኒት መውሰጃ ጊዜ የተለመደውን መጠን ይውሰዱ። የረሱትን ጨምረው ለመውሰድ አይሞክሩ።

የጎን ጉዳት (Side-effect)

ይህን መድሀኒት የሚወስዱ አንዳንድ ሰዎች የሚከተሉት የጎን ጉዳቶች ሊያጋጥማቸው ይችላል

- * ማቅለሽለሽ
- * ማስታወክ
- * ተቅማጥ
- * የሆድ ድርቀት
- * የሆድ ህመም
- * የምግብ አለመፈጨት ወይም አለመንሸራሸር ችግር
- * ድካም
- * መድሀኒት የተወጋበት ቦታ ህመም
- * የማዘር ስሜት

እነዚህ የጎን ጉዳቶች ብዙ ጊዜ መድሀኒቱ ሲጀመር አከባቢ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን መድሀኒቱ ከሰውነት ጋር ሲላመድ ይተዋሉ። ካልተወ ወይም ከአቅም በላይ ከሆነ ግን ለሀኪም ያማክሩ።

ለዚህ መድሀኒት የሀኪም ክትትል ያስፈልገኛል?

የሰዓት በሽታ ያለባቸው ሰዎች የሀኪም ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ይህም የሚደረገው

1. የታዘዘላቸው መድሀኒት የደም ግሉኮሳቸውን በመቆጣጠር ያመጣውን ውጤት ለማወቅ
2. በመድሀኒቱ ምክንያት የሚመጣ የጎን ጉዳት ካለ ለማወቅ
3. በሰዓት በሽታ ምክንያት የሚመጣ ሌላ ህመም (ለምሳሌ የኩላሊት በሽታ) ካለ በጊዜ ለማወቅ እና የሚያስፈልገውን ህክምና ለማድረግ ነው።



ከመጠቀምዎ በፊት ማወቅ ያለብዎት ምንድነው?

ይህ መድሃኒት የማይታዘዝላቸው ሰዎች (Contraindication and limitation)

1. ከዚህ በፊት ይህን መድሃኒት ወስደው አደገኛ የሰውነት መቆጣት (አደገኛ አለርጂ) ያጋጠማቸው ሰዎች
2. በቤተሰብ ወይም ራሳቸው የታይሮይድ አጢ (thyroid tumor) ያለባቸው ሰዎች
3. አይነት አንድ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች
4. ከስኳር በሽታ ጋር የተያያዘ ኪቶአሲዶሲስ (diabetic ketoacidosis) ያጋጠማቸው ሰዎች ናቸው።

የመድሃኒት መስተጋብር (Drug Interaction)

አልኮል፡- እንደብዙ መድሃኒቶች ሁሉ ይህን መድሃኒት ሲወስዱ አልኮል መጠጥ መጠጣት አይመከርም።

እርጉዝ ሴቶች፡- ይህ መድሃኒት በጽንሰ ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። እርጉዝ ሴቶች ሰማግሉታይድ መውሰድ የለባቸውም። በተጨማሪ ይህን መድሃኒት የምትወስድ ሴት ልጅ ለመውለድ እቅድ ካላት ከመጸነሷ ሁለት ወር ቀደም ብላ ይህንን መድሃኒት ላዘዘላት ሀኪም እንድታማክርና መድሃኒቱን እንድታስቀድር ይመከራል። በእርግዝና ግዜ የስኳር በሽታን መቆጣጠር ለእናትም ሆነ ለፅንሱ ጤንነት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ይህን መድሃኒት የምትወስድ ሴት ከማርገዟ በፊት መድሃኒቱን ላዘዘላት ሀኪም እንድታሳውቅ ይመከራል።

የሚያጠቡ ሴቶች፡- ለሚያጠቡ ሴቶች ከሰማግሉታይድ የተሻለ መድሃኒት ሊኖር ይችላል። ሚያጠቡ ሴቶች ይህን መድሃኒት ከመውሰዳቸው በፊት ሀኪማቸውን ያማክሩ።

ምግቦች፡- ይህን መድሃኒት ሲወስዱ ጣፋጭ የሆኑ እንዲሁም ከፍተኛ ካርቦህይድሬት (carbohydrate) ያላቸውን ምግቦች (ለምሳሌ ዳቦ፣ ፓስታ፣ ጣፋጭ ፍራፍሬዎች) ይቀንሱ። ለስኳር በሽታ ተስማሚ የሆነ አመጋገብ መከተል ለመድሃኒቱ መስራት እና ለአጠቃላይ ጤንነት ጥሩ ነው።

ሌሎች ጥንቃቄዎች

የጎን ጉዳዮችን ለመቀነስና ሰውነትን ለማለማመድ ሀኪም በትንሽ የመድሀኒት መጠን ጀምሮ እየጨመረ እንዲሄድ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ራይበልሰስ ሲጀምሩ 3 ሚሊግራም በቀን አንዴ ለአንድ ወር ይጀምሩና ወደ 7 ሚሊግራም በቀን አንዴ እንዲወስዱ ይደረጋል። ሀኪም በላብራቶሪ ውጤት ላይ ተመርኩዞ የመድሀኒቱን መጠን የበለጠ ሊጨምር ይችላል። አዘምርክ የሚታዘዝላቸው ሰዎች እንዲሁ በ0.25 ሚሊግራም በሳምንት አንዴ ለአንድ ወር ተጀምሮ የሚወስዱት የመድሀኒት መጠን ወደ 0.5 ሚሊግራም በሳምንት አንድ ጊዜ እንዲወስዱ ይደረጋል። ይህ የመድሀኒት መጠን እንደታካሚው የደም ግሉኮስ ወደ አንድ ሚሊግራም በሳምንት አንዴ ሊቀየር ይችላል።

የታይሮይድ እጢ- ጥቂት ይህንን መድሀኒት የወሰዱ ሰዎች የታይሮይድ እጢ (thyroid tumor) አጋጥሟቸዋል። ይህ የጎን ጉዳት ያጋጠማቸው ሰዎች በቤተሰብ ወይም ራሳቸው የታይሮይድ እጢ የነበረባቸው ሰዎች ናቸው። የህመም ምልክቶቹን ማወቅ እና ምልክቶቹ የታዩ እንደሆነ ለሀኪም ማሳወቅ ያስፈልጋል። ይህ ህመም ሲኖር ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶች

- * አንገት አከባቢ ህመም
- * አንገት አከባቢ ሲዳስሱ ጠጣር ነገር (እጢ) መኖር
- * የድምጽ መለወጥ
- * ለመዋጥ ወይም ለመተንፈስ መቸገር
- * ሳል ናቸው።

የአይን ህመም- በአይነት ሁለት የሰኳር በሽታ ምክንያት የአይን ህመም (Retinopathy) ሊባባስ ይችላል። ይህን መድሀኒት ሲወስዱ የአይን ምርመራ የቅርብ ክትትል እንዲያደርጉ ይመከራል።

የምግብ መንሸራሸር ችግር- አይነት ሁለት የሰኳር በሽታ ከሚያመጣው ህመም አንዱ የምግብ መንሸራሸር ችግር (gastroparesis) አንዱ ነው። ይህ ህመም ያጋጠማቸው ሰዎች ሰማግሉታይድ ከመውሰዳቸው በፊት ከህኪማቸው ጋር ስለተሻለ አማራጭ ቢማከሩ ጥሩ ነው።

የጣፊያ ህመም- ይህ መድሀኒት የጣፊያ ህመም (pancreatitis) ሊያባብስ ይችላል። ይህ የጎን ጉዳት በተለይ የህምት ጠጠር ያለባቸውና የአልኮል መጠጥ ሱስ ያለባቸው ሰዎች ላይ ሊታይ ይችላል። የዚህ ህመም ምልክቶች ሀይለኛ የማያቋርጥ እና እስከጀርባ ድረስ የሚሰማ የሆድ ህመም ማቅለሽለሽ ማስታወክ እና ዘይት ያለበት የሚመስል ሰገራ ሊሆን ይችላል። ይህን መድሀኒት እየወሰዱ እንዲህ ያለ ህመም የሚሰማው ሰው ለሀኪሙ እንዲያሳውቅ ይመከራል።

የኩላሊት በሽታ- በጥቂት ሰዎች ላይ ሰማግሉታይድ የኩላሊት በሽታን ሊያባብስ ይችላል። በዚህ መድሀኒት ምክንያት የኩላሊት ህመማቸው የተባባሰባቸው ሰዎች መጀመሪያ የማቅለሽለሽ ማስታወክና ተቅማጥ አጋጥሟቸዋል። እነዚህ የህመም ምልክቶች የሰውነት ውሃ ይዘት መቀነስ (dehydration) ሊያስከትሉ ይችላሉ። የሰውነት ውሃ ይዘት መቀነስ የኩላሊት በሽታን ሊያባብስ ስለሚችል የኩላሊት ህመም ያለበት ሰው እንዲህ ያሉ ህመም ምልክቶች ከታዩበት ለሀኪም እንዲያሳውቅ ይመከራል።

የህምት ጠጠር- ይህን መድሀኒት የሚወስዱ ጥቂት ሰዎች የህምት ጠጠር አጋጥሟቸዋል። የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩ የዚህ ህመም ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ ለሀኪም ማሳወቅ ተገቢ ነው።

- * በሆድ የላይኛውና የቀኝ ክፍል የሚሰማ ህመም
- * ትኩሳት
- * ማቅለሽለሽና ማስታወክ
- * የአይን ነጭ ክፍል ወደቢጫ መለወጥ

አደገኛ የሰውነት መቆጣት- አንዳንድ ሰዎች ለዚህ መድሀኒት አደገኛ የሰውነት መቆጣት (አደገኛ አለርጂ) ሊኖራቸው ይችላል። አናፍላክሲስና (Anaphylaxis) አንጂዮኤዲማ (Angioedema) አጣዳፊ ህክምና የሚያስፈልጋቸው አለርጂ አይነቶች ናቸው። የህመም ምልክቶች ከታዩ ሀኪም ጋር መሄድ አስፈላጊ ነው። ዋና ዋና ምልክቶች እነዚህን ያካትታል

- * ለመተንፈስ መቸገር
- * የፊት የምላስ የከንፈር ወይም የጉሮሮ ማበጥ
- * የቆዳ ሽፍታና ማሳከክ
- * የማዞር ስሜት
- * የልብ ትርታ መጨመር



ዝቅተኛ የደም ግሉኮስ- ይህ መድሀኒት ብቻውን ሲወሰድ ዝቅተኛ የደም ግሉኮስ (hypoglycemia) አያመጣም። ነገር ግን ከሌሎች የስኳር በሽታ መድሀኒቶች ጋር እንደተጨማሪ በሚወሰድበት ጊዜ የዝቅተኛ የደም ግሉኮስ (Hypoglycemia) ምልክቶችንና መወሰድ ያለበትን ጥንቃቄ ማወቅ ያስፈልጋል።

ሀይፓግሊሴሰሚያ (Hypoglycemia)

የደም ግሉኮስ ሲለካ ከ70 በታች ሲሆን ወይም አንዳንድ የህመም ምልክቶች ሲታዩ የደም ግሉኮስ ማነስ (Hypoglycemia) ይባላል። እንደከፍተኛ የደም ግሉኮስ ሁሉ ይህ የደም ግሉኮስ በጣም ዝቅ ማለት ለጤና አደገኛ ሊሆን ይችላል።

ይህን የጎን ጉዳት ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች ውስጥ መድሀኒቱን ያለምግብ መውሰድ፣ በቂ ምግብ አለመመገብ፣ እና ሌሎች አንዳንድ መድሀኒቶች ናቸው። እንዲሁም ከ65 አመት በላይ እድሜ ያላቸው ሰዎች ለዚህ ጎን ጉዳት የበለጠ የተጋለጡ ናቸው። ምልክቶቹን ማወቅ እና ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው።

ዋና ዋና የህመም ምልክቶች

- * የረሀብ ስሜት
- * የመንቀጥቀጥ ስሜት
- * በላብ መጠመቅ
- * ብሽታ
- * የሰውነት መዛል
- * ያለተለመደ ግራ መጋባት (confusion)
- * ራስ ማዘር
- * የልብ በሀይል መምታት፣
- * እንዲሁም ከባለ እራስን መሳት ናቸው።

እነዚህ ምልክቶች የተሰማው ሰው የሚከተሉትን ማድረግ አለበት

1. ከተቻለ የደም ግሉኮስ መለካት
2. ይህ ካልተቻለ ወይም ተለክቶ የደም ግሉኮስ ከ70 በታች ከሆነ ስኳርነት ያለው ምግብ ወይም መጠጥ መውሰድ። ለምሳሌ የግሉኮስ ታብሌት፣ አንድ ማንኪያ ስኳር፣ ማር፣ ከረሜላ፣ ግማሽ ብርጭቆ የብርቱካን ጭማቂ ወይም አንድ ብርጭቆ ወተት መውሰድ ይቻላል።
3. ከ15 ደቂቃ በሁዋላ የደም ግሉኮስ ከ70 በላይ መሆኑን ለማረጋገጥ በድጋሚ መለካት።
4. ተለክተው ከ70 በላይ ከሆነ ቀለል ያለ ምግብ መመገብ
5. ተለክተው ከ70 በታች ከሆነ ከ 1 -3 ያሉትን የደም ግሉኮስ ከ70 በላይ እስኪሆን ድረስ መደጋገም።
6. የስኳር በሽታዎን ለሚከታተል ሀኪምዎ መንገር አደርሱ።

ለስማግሉታይድ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ (FDA Blackbox Warning)

- በቤተሰብ ወይም የታይሮይድ ካንሰር ወይም እጢ (thyroid tumor) ያለባቸው (የነበረባቸው) ሰዎች ይህ መድሀኒት መውሰድ የለባቸውም።
- በቤተሰብ ወይም ራሳቸው የኢንዶክሪን ኒዮፕላዥያ ሲንድሮም (Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome) ያለባቸው ሰዎች ይህ መድሀኒት መውሰድ የለባቸውም።

መድሃኒቱ መቀመጥ ያለበት ቦታ

ራይበልሰስ

- ይህ መድሀኒት እርጥበትና ሙቀት በሌለበት ህጻናት በማይደርሱበት ቦታ ይቀመጣል።
- መድሀኒቱን በመጣበት ካርቶን ማስቀመጥ ጥሩ ነው።

አዘምርክ


- ያልተጀመረ ፔን ማቀዝቀዣ (ፍሪጅ) ውስጥ ይቀመጣል። የበረዶ ቤት (freezer) ውስጥ መቀመጥ የለበትም። መድሀኒቱ በረዶ ከሰራ ይበላሻል። ስለዚህ ማቀዝቀዣው ውስጥ በረዶ ከሚሰራው ክፍል ርቆ መቀመጥ አለበት።
- የተጀመረ ፔን ከማቀዝቀዣው ጭንቀት እርጥበት በሌለበት ህጻናት በማይደርሱበት ቦታ መቀመጥ ይችላል።
- ከማቀዝቀዣው ጭንቀት የተቀመጠ ወይም የተጀመረ ፔን ለ 56 ቀን ሳይበላሽ ይቆያል።
- የጸሀይ ብርሀን መድሀኒቱን ሊያበላሽ ይችላል። ስለዚህ ፔን ሁሉም መከደን እና የጸሀይ ብርሀን የማይደርስበት ቦታ መቀመጥ አለበት።



የአዘምቢክ (ሰማግሎታይድ) ፔን አጠቃቀም

የሚያስፈልጉ ነገሮች

- አዘምቢክ ፔን
- የፔን መርፌ
- አልኮል ስዋብ
- የመርፌ መጣያ



ስዕል 1 የአዘምቢክ ፔን እና ክፍሎች

1. ፔኑን ማዘጋጀት

አዲስ የአዘምቢክ ፔን ከመወሰዱ በፊት መዘጋጀት ወይም አክቲቬት መደረግ አለበት። አንድ ፔን አክቲቬት የሚደረገው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ፔኑን ለማዘጋጀት የሚከተሉትን ማድረግ ያስፈልጋል።


ሀ. እጅ በውሀና በሳሙና መታጠብ

ለ. ፔኑን ከፍራጅ ማውጣት ከዘመ የፔኑን ክዳን (1) ከፍቶ በመድሀኒት ማሳያ መስኮት (2) በኩል የሚታየው መድሀኒት ንጹህ ጠጣር (ጓጓላ) ነገር የሌለው እንዲሁም እንድውሀ ቀለም የሌለው መሆኑን ማረጋገጥ።

- ፈሳሹ መልኩን ከቀየረ ወይም ውስጡ የሚታይ ጠጣር ነገር ካለው ይህንን ፔን መጠቀም አያስፈልግም።

ሐ. መርፌውን መጣጠም

1. ከመርፌው ጀርባ ላይ የሚገኘውን የሚላጥ የወረቀት መሸፈኛ (2.4) ማንሳት
2. የመርፌውን የውጭ ክዳን (2.1) በመያዝ መርፌውን ከፔኑ የመርፌ ማስሪያ ጋር ማያያዝና እያዘዘ ማጥበቅ
3. የመርፌውን የውጭ ክዳን (2.1) ጎትቶ ማውለቅ (ይህን የውጭ ክዳን ቅርብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል)
4. የመርፌውን የውስጥ ክዳን (2.2) ጎትቶ ማውለቅ። ይህንን የውስጥ ክዳን መጣል ይቻላል።




ስዕል 2 የፔን መርፌ

- በዚህ ጊዜ የመርፌው ጫፍ ላይ ፈሳሽ ሊታይ ይችላል። ይህ ችግር የለውም።


መ. መድሀኒቱ እንደሚፈስ ማረጋገጥ

1. የመድሀኒቱን መጠን መምረጫ ቀለበት (3) በማዞር በመድሀኒት መጠን ጠቋሚ መስኮት (4) ላይ ጥቁር ነጠብጣቦች እንደምታዩ ማረጋገጥ።



ስዕል 3 የመድሀኒትን መምረጫ ቀለበትን ማዞር

2. መርፌው ወደላይ እንዲሆን አድርጎ ፔኑን ወደላይ ቀጥ አድርጎ መያዝ
3. የመድሀኒት መጠን ጠቋሚ መስኮቱ (4) ላይ “0” የሚል ቁጥር እስከሚታይ ድረስ የመጫኛ ቁልፉን (5) መጫን
4. በዚህን ጊዜ የመርፌው ጫፍ ላይ ቢያንስ አንድ ጠብታ ፈሳሽ እንደምታይ ማረጋገጥ
 - በመርፌው ጫፍ ላይ መድሀኒት ካልታየ ከ “መ” ስር የተጠቀሱትን እስከሰድስት ጊዜ መደጋገም
 - ከሰድስት ጊዜ ሙከራ በኋላ ጠብታ ፈሳሽ መርፌው ጫፍ ላይ ካልታየ መርፌውን ቀይሮ መሞከር
 - መርፌውን ተቀይሮ መድሀኒቱ በመርፌው ጫፍ ላይ የማይታይ ከሆነ ይህንን ፔን መጠቀም አያስፈልግም።
5. መድሀኒቱን ለመውሰድ ዝግጁ ከሆነ ከዚህ በታች የተጻፈውን ያንብቡ። ዝግጁ ካልሆኑ መርፌውን አውልቆ በተገቢ የመርፌው መጣያ ውስጥ መጣል። ፔኑን ከድነው ንጹህ እርጥበት ሙቀትና ልጆች የማይደርሱበት ቦታ ማስቀመጥ።



ስዕል 4 ፔኑን ቀጥ አድርጎ መጫኛ ቁልፉን መጫን

2. የእለት ተእለት አጠቃቀም።

ሀ. እጅ በውሀና በሳሙና መታጠብ

ለ. ፔኑን ከፍሪጅ ማውጣት ከዛም የፔኑን ክዳን (1) ከፍቶ በመድሀኒት ማሳያ መስኮት (2) በኩል የሚታየው መድሀኒት ንጹህ ጠጣር (ጓጓላ) ነገር የሌለው እንዲሁም እንድውሀ ቀለም የሌለው መሆኑን ማረጋገጥ።

- ፈሳሹ መልኩን ከቀየረ ወይም ውስጡ የሚታይ ጠጣር ነገር ካለው ይህንን ፔን መጠቀም አያስፈልግም።

ሐ. መርፌውን መግጠም

5. ከመርፌው ጀርባ ላይ የሚገኘውን የሚላጥ የወረቀት መሸፈኛ (2.4) ማንሳት
6. የመርፌውን የውጭ ክዳን (2.1) በመያዝ መርፌውን ከፔኑ የመርፌ ማሰሪያ ጋር ማያያዝና እያዘዘ ማጥበቅ
7. የመርፌውን የውጭ ክዳን (2.1) ጎትቶ ማውለቅ (ይህን የውጭ ክዳን ቅርብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል)
8. የመርፌውን የውስጥ ክዳን (2.2) ጎትቶ ማውለቅ። ይህንን የውስጥ ክዳን መጣል ይቻላል።
 - በዚህ ጊዜ የመርፌው ጫፍ ላይ ፈሳሽ ሊታይ ይችላል። ይህ ችግር የለውም።

መ. መድሀኒቱን መሙላት


የመድሀኒት መጠን ጠቋሚ መስኮት (4) ላይ ሀኪም ያዘዘው የመድሀኒት መጠን እስከሚታይ ድረስ የመድሀኒቱን መጠን መምረጫ ቀለበት (3) ማዞር።

- የመድሀኒት መጠን መምረጫ ቀለበቱ (3) በዞረ ቁጥር “ቀጭ” የሚል ድምጽ ይሰማል። ይህንን እንደምልክት መጠቀም ጥሩ አይደለም።
- የመድሀኒት መምረጫ መስኮት (4) “1” ቁጥር ከማሳየቱ በፊት መድሀኒት መጠን መምረጫ ቀለበቱ (3) አልዞሮ ካለ በቂ መድሀኒት ፔኑ ውስጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ፔን መጠቀም ያስፈልጋል።



ሠ. መድሀኒቱን መውጋት

አዘምቢክ ወደቆዳ ስር የሚወጋ መድሀኒት ነው። ትክክለኛ የመውጫ ቦታዎችን ለማወቅ የሚከተለውን ስእል 5 ላይ መመልከት ይቻላል።



ስዕል 5 አዘምቢክን ለመውጫ ተገቢ የሆኑ የሰውነት ክፍሎች

1. ለመውጫ የተመረጠውን ቦታ በአልኮል ስዋብ ማጽዳት
 - መርፌውን ከመውጫ በፊት አልኮል መድረቁን ማረጋገጥ
2. መርፌውን የተጸዳው ሰውነት ላይ መውጫ
 - የፔኑን የመድሀኒት መምረጫ መስኮት (4) እንዲታይ አድርጎ መያዝ ያስፈልጋል
3. የመድሀኒት መጠን መምረጫ መስኮቱ (4) ላይ “0” የሚል ቁጥር እስከሚታይ ድረስ የመጫኛ ቁልፉን (5) ተጭኖ መቆየት
 - “ቀጭ” ወይም “ክሊክ” የሚል ድምጽ ሊሰማ ይችላል
 - መርፌው ሰውነት ውስጥ እንደተሰከፍ የመጫኛ ቁልፉን (5) እንደተጫኑ እስከ ስድስት ቀስ እያሉ መቁጠር (ወይም ስድስት ሰከንድ መቆየት)
 - መርፌውን ቸኩሎ መንቀል በቂ የመድሀኒት መጠን እንዳያገኙ ያደርጋል።
 - ለስድስት ሰከንድ ያህል የመጫኛ ቁልፉን (5) ተጭኖ ከተቆየ በኋላ የመድሀኒት መጠን መምረጫ መስኮት (4) ላይ “0” ካልታየ መርፌው ተደፍኖ ሊሆን ይችላል። እንዲህ ከሆነ መርፌውን ቀይሮ እንደገና በ “ሠ” ስር ያሉትን መድገም ያስፈልጋል።
 - በሚወጉበት ጊዜ የመድሀኒት መጠን መምረጫ መስኮቱን (4) በእጅ መንካት አያስፈልግም።
4. መርፌውን መንቀል
 - መርፌው ሲንቀል በመርፌው ጫፍ ላይ ጠብታ የመድሀኒት ፈሳሽ ሊታይ ይችላል። ይህ ምንም ችግር የለውም።
5. መርፌውን ማስወገድ
 - መርፌውን በጥንቃቄ ከፔኑ ላይ መፍታት
 - መርፌውን ህጻናት የማይደርሱበት ለዚህ መጣያ ተብሎ በተዘጋጀ ክዳን ባለው የመጣያ እቃ ውስጥ ያስወግዱ።
6. ፔኑን በራሱ ክዳን መክደን መድሀኒቱን ከጸሀይ ብርሀን ይከላከላል። ስለዚህ ሁሉ የአዘምቢክ ፔን ሲቀመጥ መርፌው ተነቅሎና በራሱ ክዳን ተክድኖ መሆን አለበት።



ስዕል 6 መድሀኒቱን ከወጥ በኋላ መጫኛ ቁልፉን ይዞ እስከስድስት ቀስ እያሉ መቁጠር

ማጣቀሻ

1. Brunton, Laurence L., et al. Goodman & Gilman's: the Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw Hill Medical, 2018.
2. OZEMPIC (semaglutide) injection [package insert]. DK-2880 Bagsvaerd Denmark: Novo Nordisk A/S; 2017.
3. Pharmacotherapy Handbook, by Barbara G. Wells et al., McGraw-Hill Education, 2017, pp. 161–175.
4. RYBELSUS (semaglutide) tablets [package insert]. DK-2880 Bagsvaerd Denmark: Novo Nordisk A/S; 2019.

ቀን: 02/19/21